AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VASLUI
Adresa: Șoseaua Națională, nr. 96
Loc. Vaslui, jud. Vaslui
T 0235 473 942
F 0235 473 942
Email:ofvaslui@anfof.ro

PRIMĂRIA COM. POIENEȘTI
JUD. VASLUI
INTRARE NR. 2398
IEȘIRE
ZIUA 13 LUNA 04 ANUL 2023

Nr. 012 /O/20.04.2023

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Rapăn T1**(*Venturia inaequalis,V. pirina*), **Făinare T2** (*Podosphaera leucotricha*), **Foc bacterian** (*Erwinia amylovora*), **Păduche lânos** (*Eriosoma l.*), **Molia cojii fructelor** (*Adoxophyes reticulana*) – larve hibernante, purici meliferi, aflde.
Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **MĂR, PĂR**
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: Tratament obligatoriu înainte de înflorit
Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Polyram DF = 2,5 kg/ha + Kumulus DF = 3 kg/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha sau**
2. **Alcupral 50 PU = 2 - 3 kg/ha + Sulfolac 80 WG = 3 kg/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha sau**
3. **Sercadis = 0,25 l/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha.**

Perioada optimă de tratament: " ***răsfirarea inflorescenței - înfoierea corolei"*** (înainte de înflorit).
În livezile unde s-a manifestat Focul bacterian al rozaceelor (*Erwinia amylovora*) recomandăm efectuarea tratamentelor cu produse cuprice.

Alte recomandări:

- instalarea capcanelor cu feromoni de sinteză pentru: AtraPOM, AtraMOL, AtraBLANC, AtraRET, Atra SCIT, atraPERN - pentru stabilirea curbei de zbor ale moliilor miniere, viermelui merelor, moliei pieliței fructelor, San José;
- **Atenție! In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.**
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligații:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicări/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumel pers.responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare:boli/ dăunători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Dr. Ing. Carmen Miroiu

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VASLUI
Adresa: Şoseaua Naţională, nr. 96
Loc. Vaslui, jud.Vaslui
T - 0235 473 942
F - 0235 473 942
Email:ofvaslui@anfof.ro

PRIMĂRIA COM. PODENEȘTI
INTRARE NR. 2384
IEȘIRE
ZIUA 21 LUNA 04 ANUL 2023

Nr. 011 /O/20.04.2023

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Viespile cu ferăstrău ale prunului** (*Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava*), **Viespea semințelor de prun** (*Eurytoma* **schreine**ri) **T1 + T2, Pătare roşie T1** (*Polystigma rubrum*), **Monilioza sâmburoaselor** (*Monilinia l.*).
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Prun**
pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: **Tratament de sigutanţă pentru boli.**
PED viespi = 2 % flori cu pontă.
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Karate Zeon (Ninja) = 0,150 l/ha + Signum (Syrex Star) = 0,5 kg/ha sau**
2. **Faster 10 CE = 0,250 l/ha + Syllit 400 SC = 2,0 l/ha**

Perioada optimă de tratament: " când 15 % din flori au început să-şi scuture petalele " după 6 zile se face tratamentul 2 pentru **Viespea semințelor de prun** (*Eurytoma* **schreine**ri). Apariţia în masă a viespilor coincide cu fenofaza de **"desprinderea caliciului florilor".**

Viespea semințelor de prun: iernează ca larvă în sâmburii infestaţi căzuţi pe sol. După apariţie, viespile perforează pulpa fructelor şi depun ouăle în seminţele crude. Fructele atacate pot fi identificate chiar înainte de căderea din pom, deoarece îşi schimbă culoarea în violaceu, prezintă o simetrie şi un început de veştejire. La atacuri mai puternice se formează sub coroana pomilor un adevărat covor de fructe căzute. Atacul poate fi depistat prin spargerea sâmburilor. Viespea sâmburilor prezintă pericol până la lemnificarea sâmburilor.
Viespile cu ferăstrău ale prunului (*Hoplocampa spp*): iernează ca larvă în solul de sub scoarţa pomilor, la 2 -10 cm. Depun ouăle în epiderma unei sepale sau receptaculul floral, **iar apariţia larvelor coincide cu căderea petalelor.**

- **Atenţie!** In cazul tratamentelor complexate efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
- **Citiţi cu atenţie toate informaţiile de pe eticheta produselor.**
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele **obligaţii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin **autorizaţie** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor"** - emis de Autoritatea Naţională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie, precum şi **registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafaţa (ha)	Cantităţi utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecţia familiilor de albine respectaţi Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ ROMÂNIA Oficiul Fitosanitar Vaslui